

épilepsie
suite d'une
chute sur
la tête.

n° 277. Mémoire présenté à Monseigneur
l'Evêque de Limoges pour servir
d'instruction à l'histoire de la maladie
de

Le Malade dont il s'agit, naquit en mai 1757
de parents très honnêtes et par leurs mœurs à l'abri
de tout soupçon. L'histoire de sa famille tant
paternelle que Maternelle ne fit jamais mention
de personnes épileptiques.

Ce jeune homme est d'un tempérament qui
tient du bilieux et du sanguin, il a joui les
Dix premières années de sa vie d'une santé
athlétique qui le faisait regarder par ses
amis et ses parents comme le mieux constitué
de ses frères. Doué d'un Caractère joyeux et d'une
force musculaire peu commune; il passa les
premières années dans les amusements et les
exercices de l'enfance.

alors on lui fit sentir qu'il devait changer
de conduite et s'adonner plus sérieusement
à ses devoirs. il promit. mais toujours dissipé
il ne faisait que des progrès très lents. Son
précepteur d'un Caractère dur, Crut en le
frappant le ramener à son devoir. il le
maltraitait souvent et à l'insu de ses parents
qu'il craignait trop pour s'en plaindre.
Cet enfant recevait souvent des coups
à la tête et des poussées contre la

ARC 43

n° 128



Muraille qui le menaçoit, disait-il à ses camarades, tout stupide, et qui lui otait même jusqu'à l'idée des amusements aux quels il s'adonnait auparavant avec tant de plaisir.

un jour de l'hiver de 1767. il descendait de sa chambre étourdy par les coups qu'il avait reçus et avançant le pas pour fuir son rigide correcteur, le pied lui glissa étant sur l'escalier il tomba en avant, la tête fut frappée contre une grosse pierre qui forme la dernière marche. malgré la violence du coup il n'y eut aucune plaie, pas même de contusion apparente.

Cet enfant laissa ignorer cette chute, et ne se plaignit qu'au bout de deux jours d'un violent mal de tête, qui l'avait contraint à se mettre au lit. Cette douleur des plus aiguës dura au plus cinq heures au bout des quelles il fut pris comme par un coup de foudre de l'ouïe, de la vue et de la parole. le dessous des yeux se noircit peu à peu, les vaisseaux sanguins se gorgèrent et devinrent comme variqueux. on rapporte que dans cet état le malade tournait continuellement la tête de droit à gauche. non par un mouvement convulsif, mais comme

Si la nature Eut voulu se servir de ce moyen pour ranimer la Circulation du Sang Halentie dans le Cerveau, par fois il poussait des hurlements suivis d'efforts violents pour s'ortir de son lit.

Le Medecin qui le vit alors Est mort depuis plusieurs années; Ce qui nous Empêche de narrer cette histoire avec exactitude. Ce que nous en savons n'est que d'après le rapport de ses parents qui ajoutent que pour tous remèdes il fut saigné au bras, au pied, qu'on appliquât quelques sangsues aux Tempes, et qu'on lui soufflait dans les narrires un violent Sternutatoire qu'on ne nomme pas.

il resta dans cette situation trois jours entiers au bout des quels il reprit peu à peu ses sens, et guérit: Si on peut dire qu'il le soit. C'est là que nous croyons pourvoir fixer l'époque de la maladie dont il Est affligé aujourd'hui, et n'avons nous pas tout lieu de le croire par ce que nous venons de tracer icy et par ce qui s'Est passé du depuis.

A peine Convalescent cet Enfant sentit un mal de tête continu et fixé à l'endroit de la chute qu'on peut dire Etre à peu pres au milieu de la partie latérale gauche.



de l'os frontal. qu'il dit ne l'avoit quitté
que du plus au moins depuis l'instant
qu'il revint à lui. a cette douleur succédant
de temps en temps des éblouissements, des
battements dans le cerveau, et de légères
convulsions dans les muscles qui font
mouvoir l'œil gauche. C'est ainsi qu'il
passa sept années sans faire attention
au danger qui le menaçait, devenu
aussy tranquille et modéré qu'il avait
été vif et dissipé.

au mois d'août 1774. Etant en
classe il sentit augmenter tous ces
symptômes, cria quelques uns de ses
camarades à son secours et tomba
en convulsion. Ce premier accès dura
un quart d'heure et se termina par
un assoupissement qui d'après le rapport
de ses amis semble tenir de l'apoplexie.
un d'eux le saigna sur le champ,
on répéta ce remède le lendemain, on le
fit purger et voilà tout.

Nous ne savons pas si cette première
attaque fut bien caractérisée épilépti-
que, il y a pourtant lieu de le soupçonner.

Ce que nous savons de bien certain —
Est qu'il resta deux ans entiers sans en —
avoir d'autres. Ce fut dans une université
où il faisait son cours de philosophie que
lui survint la seconde il était en même
de soutenir une thèse publique avec —
cinq, ou six de ses collègues lorsque
il la sentit arriver, il sortit de la salle
des actes et courut à un appartement —
voisin où il tomba. il y resta longtemps
sans s'éveiller. on s'y rendit enfin et on le
vit couché sur le ventre, la figure et
les mains extrêmement noires, sans —
mouvement et sans sensation. —
le Medecin qui y accourut le crut
mort d'apoplexie, on lui ouvrit la —
jugulaire et la mediane; on le voyait
revivre peu à peu à proportion que le —
sang coulait; on repeta les saignées,
on le purgea et en fut quitte ainsi, à cela
pres pourtant qu'il resta trois semaines
avant d'avoir repris sa couleur naturelle.
La robe dans laquelle il se trouva —
enveloppé et serré ne peut elle pas avoir
un peu contribué à cette apoplexie —



Survenue aux Convulsions? le Malade
lui même Raporte en avoir Eû de violentes
et avoir Entendu ce que lon disoit dans
la Sale pendant qu'il se débatoit

on lui fit dans cette ville quelques
autres remèdes, mais tous sans effet.
il y Eut d'autres accès et y resta jusques
en Janvier 1777. alors sa famille alarmée
sur son sort le Rapella dans son Sein pour
lui procurer avec tous les agréments
propres à adoucir sa Situation les remèdes
les plus prompts à le Secourir.

C'est dans le tems que nous Entreprîmes
de le guerir, mais, hélas! nos efforts et les
moyens que nous Employâmes sont
Devenus inutiles. voicy sans dequiescence,
sans entrer dans de grandes dissertations
physiologiques dont fourmillent les livres
de médecine, et avec toute la Candeur
d'un vrai medecin, ce que nous fîmes
à cet infortuné.

peu de jours apres son arrivée nous
ordonnâmes d'abord qu'il fut transporté
à la Campagne. il y fut trois mois
sans accès; ce fut sous nos yeux que

lui Survint le premier, il fut de peu de
durée mais bien Caractérisé épileptique.
il le sentit venir, eut le temps de nous
appeler, de Défaire son Col, de se Deboutonner,
et de s'arroier; la il Entra en Convulsions,
Elles Durèrent trois ou quatre minutes, et
furent suivies d'un assoupissement à peu
pres de la même durée: avant un quart
d'heure il eut Repri sa parfaite Conna-
issance, et nous rapporta les mêmes
paroles que nous avions prononcées
pendant qu'il était dans les Convulsions.

D'autres attaques qui ne tardèrent
pas à suivre celle la nous Décidèrent
à le confirmer épileptique comme nous
l'avions déjà avancé. dans cette
persuasion nous lui prescrivîmes d'abord
l'usage des femmes, de la Masturbation
à laquelle il nous à dit, s'être livré
avec acharnement; lui Défendîmes aussi
le vin, la liqueur, le Café, les exercices
trop violents &c. &c. &c. Nous lui
recommandâmes la gaieté, la promenade,
la Chasse, la dissipation et tout le qui
pourrait lui faire oublier sa Situation



Sur laquelle il s'affligeait douloureusement.
En suite après avoir fait preceder les remèdes
généraux que nous répétâmes deux ou
trois fois, nous lui ordonnâmes les Bains
tièdes ou il restait au moins une heure.
il prenait peu de tems après s'y être mis
des Bols faits avec la valeriane d'auvage,
le Sel Sedatif, et la teinture de Castoreum,
à une dose un peu plus qu'ordinaire, —
par dessus les quels il buvait un grand
verre de petit Lait ou avait infusées des
fleurs d'oranges et de tilleuls. au sortir, on
quelque tems avant d'Entrer dans le Bain,
on lui donnait un Laxement émollient.
on le remettait au Lit ou il restait —
quelques heures, se levait et Dejeunait —
environ les neuf heures du matin avec une
soupe au lait, ne prenait que des aliments
tres doux et les plus faciles à Digérer, presque
tous tirés des vegetaux, des œufs et du lait;
N'avait d'autre Boisson que le petit lait
nitré, ou une tisane faite avec une —
infusion de fleurs de tilleuls, d'oranges
et autres antispasmodiques vegetaux.
il faisait, ou à la Chasse, ou à la promenade,

un exercice modéré, se couchait assés —
à bonne heure, et prenait presque chaque
soir un laxement.

pendant ce traitement qui dura —
60. jours il n'eut aucun accès, au bout de
cetems la il fut saigné et purgé, alors
voyant que le mal de tête n'avait que
très peu diminué, nous luy fimes —
appliquer un large Emplâtre vericatoire
entre les deux épaules. il ne voulut le
laisser supurer qu'une semaine, n'en
sentant aucun soulagement.

enfin degouté du regime et ennuyé
des remedes il ne voulut pas les pousser
plus loin. il fut malgré cela sept mois
entiers sans avoir aucune attaque, —
souffrant toujours du mal de tête, et
ayant par fois de legers éblouissements.
il s'était rendu en ville, il vit tomber
dans la rue un Epileptique, ça l'affecta
si vivement qu'il eut un accès le lendemain.
Cet accident le determina a repartir —
pour la campagne ou il en eut plusieurs
irregulierement jusques en janvier 1778.
dans ce mois la il luy survint une —



fièvre continue remittente qui dura —
huit jours, l'ar violence nous faisant —
craindre pour l'avis, nous Decida —
malgré nous à luy faire tirer du sang —
le troisième jour de son invasion. —
le pouls alors Baissa mais peu, le delire —
diminua ainsi que la soif, enfin la —
fièvre tomba le huitième jour, et fut —
un palliatif de cinq a six mois —
à l'épileptie qui reprit au commencement —
de l'été de cette même année, et qui ne —
la quitta point jusqu'à le jour, —
N'ayant dans ses attaques aucune marche —
reguliere, laissant tantot huit, quinze jours —
d'intervalles, quelques fois un mois, un mois —
et demy. H. H. H.

il Serait inutile et minutieux de —
Detailer dans ce memoire déjà trop long, —
de Combien d'espèces de remedes il a usé —
à notre infirmité. il en a essayé des femmes, —
des charlatans, des Empiriques et de tous ceux —
qui lui en offraient.

aujourd'hui voyant le faux de sa Credulité, —
et Desirant ardemment de guerir, il Est Decidé —
à Subir telle operation qu'on Jugera à propos, —
et à faire les remedes qu'avisent les gens

de l'art, de quelque nature qu'ils puissent être.

L'opération du trepan nous semble promettre, si non une cure parfaite, — au moins de grands soulagemens: et pour établir notre croyance Rappelons en deux mots tout ce qui s'est passé.

L'épileptique est né de parens très-sains, et parmi ses ancêtres on n'a jamais compté personne qui eût cette maladie, pas même la plus légère affection nerveuse. La chute qu'il fit, l'histoire de la maladie qui lui survint, la douleur de tête — continuelle, aiguë, et fixe à l'endroit même de la chute, semblent l'autoriser.

D'ailleurs le malade n'a point les yeux égarés ni chargés d'une espèce de voile comme les autres épileptiques, qu'on ou deux jours avant son accès, ordinairement il en est averti trois jours avant, et souvent huit jours par l'augmentation de la douleur de tête, par des éblouissements répétés, l'œil gauche se ferme par un mouvement convulsif plusieurs fois dans une heure, il s'est dit-il, au point de la douleur un tiraillement s'effort qu'il lui —



Sembler qu'il y a une corde attachée —
que quelqu'un tire avec violence. et —
tout cely Disparaît dans l'instant que
l'accès commence.

Souvent la mâchoire inférieure Entre
peute en Convulsion, et le reste de son Corps
Est dans un état Cataleptique.

D'autres fois croyant avoir un accès
il Crie, Demande du Secours Comme quand
il en a réellement et en Est quitte pour
une Secousse interne que personne —
n'apercevrait s'il ne changeait de —
couleur: cely luy arrive principalement
quand il Est avec des personnes étrangères,
ou lors qu'il Est Seul.

quel exemple de la puissance du moral
sur le physique?

D'après toutes ces Singularités étrangères
aux épileptiques ordinaires peut-on Conclure
au Trepan?

il paraît évident que, ou le Cerveau,
ou ses membranes, ou des vaisseaux ne sont
affectés que Symptomatiquement, et non
essentiellement. il y aurait encore lieu
de croire qu'il y a un engorgement —

dans la substance diptérique de l'os frontal
qui augmentant le volume de cet os
peut à certaines époques presser les
membranes du Cerveau, qui en en-
comprimant la substance alev. tout
causent l'épileptie.

ne pourrait on pas aussi soupçonner
ou une hydatide, ou un anévrisme, ou une
varice, et sur tout une de ces deux dernières
causes. Ce que l'on pourrait expliquer par
la cure palliative des sept mois que le
Malade passa sans accès. la machine
entièrement relâchée par le traitement
susdit, tous les vaisseaux et sur tout
les sanguins déchargés, le sang abondait
en moindre quantité et moins impétueu-
sement dans l'anévrisme ou la varice supposée
alors moins de volume, moins de contact
immédiat, plus de compression sur le
Cerveau, plus de Convulsions.

ajoutons pour appuyer notre système
ce qui arrive lors que le malade craint
l'accès ou par le danger de la mort, ou
par amour propre. ne paraît il pas
probable de dire que par une constriction



générale dont la peau est le stimulus —
que le diamètre de l'aîne ou de l'artère
est rétréci, ce qui peut produire pour
l'instant le même effet que les saignées
et les autres relachants produisirent.

En 1777.

on trouverait icy un champ bien vaste
pour établir des theories, mais la loi —
que nous nous sommes imposé d'être
seulement historien fidèle nous met
dans le cas de remplir notre tâche, —
et rien au delà. trop heureux encore —
si nous avons réussi et avons mis nos
lecteurs à portée de nous entendre.

observons avant de finir que le —
Malade d'un temperament bilioso-sanguin
comme nous l'avons dit plus haut, est
d'une taille assés avantageuse, bien
proportionné, d'un enbon point honete,
la figure tres colorée, les muscles —
tres distines et bien charnés, les os gros,
la poitrine extrêmement large, en fin —
d'une constitution et d'une force peu —
ordinaires.

B. /